

ECCA

Cum poți beneficia de gratuitate pentru testul Babeș-Papanicolaou?

În România, poți beneficia de gratuitate pentru testul Babeș-Papanicolaou în cadrul „Programului Național pentru depistarea activă precoce a cancerului de col uterin prin screening organizat” care urmărește să determine prezența sau absența celulelor anormale aflate în stadii inițiale, când pot fi îndepărtate ușor, înainte de a se transforma în celule canceroase (maligne).

Pentru a participa la screening, este nevoie să te programezi la medicul de familie calificat în prelevarea testului Babeș-Papanicolaou, acreditat să participe în programul național de screening.

Informații suplimentare la medicul de familie și la medicul specialist ginecolog.

SCREENING-UL CANCERULUI DE COL UTERIN

- Cancerul de col uterin se dezvoltă la nivelul colului uterin, partea uterului care se deschide în vagin. Apare atunci când celulele colului uterin devin anormale și încep să se înmulțească într-o manieră necontrolată.
- Screening-ul cancerului de col uterin depistează celulele anormale în stadii incipiente, când pot fi îndepărtate ușor, prevenind apariția cancerului de col uterin.
- Toate femeile trebuie să participe regulat la screening în perioada 25-64 de ani. La început, trebuie să vă faceți testul o dată pe an. După două rezultate consecutive normale, testul este indicat o dată la trei ani.
- Vaccinarea reduce riscul de apariție al cancerului de col uterin, dar nu elimină necesitatea efectuării screening-ului. Împreună, screening-ul și vaccinarea reprezintă cea mai eficientă protecție împotriva cancerului de col uterin.

Se distribuie gratuit.



SCREENING-UL CANCERULUI DE COL UTERIN


Direcția de Sănătate Publică Timiș



- Ce este cancerul de col uterin?
- De ce să particip la screening?
- Cine trebuie să participe la screening?
- Ce trebuie să fac?
- Cum se face screening-ul?
- Rezultat normal la testare Papanicolaou?
- Rezultat anormal la testare Papanicolaou?
- Metodele de screening sunt de încredere?

Ce este cancerul de col uterin?

Cancerul de col uterin apare la nivelul colului uterin, care este partea uterului ce se continuă cu vaginul. Apare atunci când celulele ale colului uterin devin anormale și încep să se înmulțească în mod necontrolat. De-a lungul unei perioade de mai mulți ani, celulele anormale din stadiile incipiente evoluează în cancer de col. Din fericire, stadiile inițiale ale bolii sunt ușor de tratat. Nu există semne evidente de boală, depistarea putând fi făcută prin teste de screening.



De ce să particip la screening?

Screening-ul cancerului de col uterin urmărește să determine prezența sau absența celulelor anormale aflate în stadii inițiale, când pot fi îndepărtate ușor, înainte de a se transforma în celule canceroase (maligne). O dată ce s-a produs malignizarea, tratamentul este mai dificil și cu o rată de succes mai scăzută.

Virusul Uman Papilloma și cancerul de col uterin

Cancerul de col uterin este cauzat de anumite tipuri de virus uman Papilloma (HPV). Dintre 100 de tipuri de HPV, 15 pot determina apariția cancerului de col uterin. Majoritatea adulților sunt infectați la un anumit moment pe parcursul vieții, dar infecția dispare fără tratament și fără nici o manifestare. Dacă virusul nu este înlăturat de organism, poate crește riscul de apariție al cancerului de col uterin.

Cine trebuie să participe la screening?

Toate femeile cu vârsta cuprinsă între 25 și 64 de ani trebuie să fie testate pentru depistarea acestui tip de cancer.

Dacă după trei testări consecutive rezultatele sunt normale, testul Papanicolaou se poate opri la vârsta de 65 de ani. Screening-ul cancerului de col uterin reprezintă cea mai bună metodă de prevenție, dacă este făcut cu regularitate.

Ce trebuie să fac?

Pentru a participa la screening, trebuie să vă programați la un ginecolog sau la medicul de familie calificat în prelevarea testului Papanicolaou. Programarea nu trebuie să se suprapună perioadei de ciclu menstrual. Cu două zile înainte de efectuarea testului, evitați contactul sexual și tratamentele intravaginale.

Cum se face screening-ul?

Screening-ul cancerului de col uterin constă în efectuarea testului Papanicolaou. Printr-o examinare scurtă și nedureroasă, medicul va lua o mostră de celule de la nivelul colului uterin cu ajutorul unei spatule sau a unei periute speciale. Aceste celule vor fi trimise la laborator, unde vor fi examinate la microscop pentru a identifica eventuale celule anormale.



Rezultat normal la testare Papanicolaou?

Majoritatea femeilor vor avea un rezultat normal. În acest caz, riscul de apariție al unui cancer de col uterin este foarte scăzut, dar trebuie să continuați să faceți regulat acest test.

Rezultat anormal la testare Papanicolaou?

Unele femei vor avea un rezultat anormal. Acest lucru semnifică faptul că au fost depistate celule anormale. Rareori, rezultatul testului indică prezența unui cancer de col.

În funcție de rezultat, vi se va indica una dintre următoarele măsuri:

- Efectuarea unui nou test Pap în termen de 3-6 luni
- Testarea pentru virusul Papilloma, virus care poate determina apariția cancerului de col uterin
- O colposcopie – procedura care îi permite medicului să examineze mai amănunțit colul uterin.

Celulele anormale trebuie îndepărtate pentru a nu se transforma în celule maligne. Acest tratament implică o procedură simplă, putând fi efectuat în cabinetul medicului ginecolog sau în ambulator într-o clinică. Tratamentul afectează extrem de rar viața dumneavoastră sexuală și abilitatea de a avea copii.

Metodele de screening sunt de încredere?

Nu există test de screening perfect, astfel ca testul Pap poate să nu depisteze unele cazuri de boală. De aceea este necesar să vă faceți regulat testul, pentru ca orice aspect anormal neînregistrat să fie depistat la următorul test, înainte de a deveni periculos.

Programele de screening de calitate, bine organizate, sunt foarte eficiente în depistarea precoce, dar nu pot preveni toate cancerurile de col uterin.